



tento leták vám prináša váš veterinárny lekár a Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky

KOTERCOVÝ KAŠEĽ

V posledných týždňoch sa v populácii psov vo vyššej miere začína vyskytovať infekčné ochorenie, ktoré je medzi chovateľmi známe pod názvom „kotercový kašeľ“. Ide o veľmi neprijemné a vysoko nákazlivé vírusovo-bakteriálne ochorenie spôsobujúce zápal hrtana a priedušnice a prejavujúce sa silným záchvatovým kašľom, pri ktorom je majiteľ psa až presvedčený, že psíkovi niečo uviezlo v hrdle, najmä ak ide aj o vykašliavanie prieduškového hlienu, čo si majitelia zamieňajú so zvracaním.

Napriek tomu, že ide o ochorenie, ktoré sa vyskytuje najmä na jeseň pri vlhkom počasi, práve doterajší mierny priebeh zimy s relatívne vysokými teplotami spôsobil, že sa ochorenie rozvinulo aj teraz. Vyšší výskyt je v miestach s vyššou koncentráciou psov ako sú **sídliská, mestské výbehy pre psov, cvičiská alebo výstavy psov**.

Hlavnými pôvodcami ochorenia sú psie vírusy para-influenzy a adenovírusy a baktéria Bordetella bronchiseptica. Pes sa môže nakaziť aj bez priameho kontaktu s chorým psom, nakoľko sa infekcia prenáša kvapôčkovou infekciou alebo kontaktom s predmetmi, na ktorých sa patogény v prostredí udržia.

Od nakazenia po prejavy ochorenia môže prejsť aj týždeň. Priebeh je veľmi individuálny, ochorenie buď spôsobí ľahkú infekciu, z ktorej sa psík po pár týždňoch dostane sám, ale pri komplikáciách môže dôjsť aj **k zápalu priedušiek alebo pľúc** či iným život

ohrozujúcim stavom, najmä u starších a slabších zvierat. Ochorenie je nebezpečné najmä pre psov so srdcovou slabosťou.

Liečba spočíva v podávaní imunomodulačných látok na **podporu imunity psa proti vírusom** a podávania **antibiotík proti baktériám**. Používajú sa aj lieky na podporu vykašliavania hlienu a na tlmenie dráždivého kašľa. Súčasťou liečby je izolácia psa, aby nenakazil psov v okolí, absolútny klud a zvlhčovanie vzduchu v psovom prostredí. Nakoľko priedušnica môže byť citlivá na tlak zvonku, vhodné je vymeniť obojek za postroj.

Preventívnym opatrením je **vakcinácia**, ktorá je zároveň nemej nákladnejšia ako samotná liečba psa. Napriek skutočnosti, že vakcinácia nemusí byť 100% účinná, vakcinovaný pes má veľmi ľahký priebeh ochorenia a väčšinou nevyžaduje liečbu. Ideálny čas na vakcináciu je september a vakcínu je potrebné každoročne opakovať.



www.kvlsr.sk

Ak máte pocit, že váš psík javí príznaky kotercového kašľa, navštívte vášho veterinárneho lekára, ktorý ho vyšetří a po potvrdení diagnózy nasadí vhodnú liečbu.